

Exercice BAC 1 : Polynésie - juin 24

Une entreprise fabrique des objets en plastique en injectant dans un moule de la matière fondue à 210 °C. On cherche à modéliser le refroidissement du matériau à l'aide d'une fonction f donnant la température du matériau injecté en fonction du temps t .

Le temps est exprimé en seconde et la température est exprimée en degré Celsius.

On admet que la fonction f cherchée est solution d'une équation différentielle de la forme suivante où m est une constante réelle que l'on cherche à déterminer :

$$(E) : y' + 0,02y = m$$

Partie A

1. Justifier l'affichage suivant d'un logiciel de calcul formel :

Entrée :	RésoudreEquationDifférentielle ($y' + 0,02y = m$)
Sortie	$\rightarrow y = k * \exp(-0,02 * t) + 50 * m$

2. La température de l'atelier est de 30 °C. On admet que la température $f(t)$ tend vers 30 °C lorsque t tend vers l'infini.


Démontrer que: $m = 0,6$.

3. Déterminer l'expression de la fonction f cherchée en tenant compte de la condition initiale $f(0) = 210$.

Partie B

On admet ici que la température (exprimée en degré Celsius) du matériau injecté en fonction du temps (exprimé en seconde) est donnée par la fonction dont l'expression et une représentation graphique sont données ci-dessous :

$$f(t) = 180e^{-0,02t} + 30$$



1. L'objet peut être démoulé lorsque sa température devient inférieure à 50°C.

a. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre T de secondes à attendre avant de démouler l'objet.

b. Déterminer par le calcul la valeur exacte de ce temps T .

2. À l'aide d'une intégrale, calculer la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes.

Exercice BAC 2 : Amérique du Nord - juin 24

Soit a un réel strictement positif.

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = a \ln(x)$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Soit x_0 un réel strictement supérieur à 1.


1. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe $\mathcal{C}$ et de l'axe des abscisses.

2. Vérifier que la fonction F définie par :

$$F(x) = a[x \ln(x) - x]$$

est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

3. En déduire l'aire du domaine bleuté en fonction de a et de x_0 .



On note $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point M d'abscisse x_0 .

On appelle A le point d'intersection de la tangente $\mathcal{T}$ avec l'axe des ordonnées et B le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.

4. Démontrer que la longueur AB est égale à une constante (c'est-à-dire à un nombre qui ne dépend pas de x_0) que l'on déterminera.

Le candidat prendra soin d'expliciter sa démarche.

